

REGEN-D^{GEL}

ريجن - د (جل)

يرجى قراءة هذه النشرة قبل البدء في استعمال Regen-D. وقراءتها أيضا في كل مرة تقوم بتجديد الوصفة الطبية الخاصة بك، فقط في حال تغيير أي شيء. تذكر أن هذه النشرة لا تكفي أو تحل محل المناقشات الدقيقة مع طبيبك. أسأل طبيبك المختص قبل استعمال Regen-D.

• ما هو Regen-D؟

Regen-D (عامل النمو البشري البشري المؤشب rhEGF) هو جل موضعي، لتسريع شفاء قرحة القدم السكرية والقرحات المزمنة والمعدنة. Regen-D يعمل من خلال، تعزيز عملية التئام الجروح مما يقلل من وقت الشفاء بشكل كبير. يمكن أن تؤدي المضاعفات الشديدة لقرحة القدم إلى البتر (إزالة طرف الجسم عن طريق الجراحة)، يساعد Regen-D على منع هذا.

• التركيب:

كل 1 غم من Regen-D 150 تحوي على 150 ميكروغرام من عامل النمو البشري المؤشب rhEGF. كل 1 غم من Regen-D 60 تحوي على 60 ميكروغرام من عامل النمو البشري المؤشب rhEGF.

• الشكل الصيدلاني: جل الوصف وآلية العمل:

عامل النمو البشري البشري المؤشب rhEGF: يشارك في آليات نمو الخلايا والتئام الجروح.

عامل النمو البشري البشري المؤشب rhEGF: هي بروتينات صغيرة الحجم (عبارة عن سلسلة مفردة لعدد بيتيد تتألف من 53 حمض أميني تتواجد في معظم أنسجة الجسم) تحفز عملية الانقسام الخلوي من خلال الارتباط بمستقبلاتها (مستقبلات التيروزين كيناز) مما يؤدي إلى تحفيز عملية الشفاء من خلال:

1. تحفيز انقسام الخلايا الليفية. الظهارية. البطانية مما يزيد التكاثر الخلوي
2. تحفيز تكوين الأوعية الدموية.
3. يحفز تشكيل النسيج الحبيبي وتشكل الظهارة الجلدية.
4. إفراز كولاجيناز الخلايا الليفية وتصنيع الكولاجين.

• الاستطبابات:

- تدبير وعلاج القرحات المعقدة والجروح المزمنة التي مر عليها أسبوعين على الأقل ولم تستجب للأدوية التقليدية.

Regen-D 150

- علاج قرحات القدم السكرية.
- علاج قرحات الفراش.
- علاج قرحات الاوعية الدموية.

Regen-D 60

- الحروق
- الطعوم الجلدية

• ما هي الإرشادات العامة لتطبيق Regen-D؟

- يجب اتباع الاجراءات الأساسية الخاصة بتبديل الجروح السكرية بدقة أثناء استخدام Regen-D
- يجب الحفاظ على الضغط الصحيح لنسبة السكر في الدم على النحو الموصى به من قبل الطبيب المعالج.
- يجب الالتزام بالدلائل الإرشادية لتدبير القرحات والعناية الصحيحة بالقدم السكرية باستخدام Regen-D جل

• التطبيق

- يطبق Regen-D بشكل عقيم.
- 1. إجراء تنظيف للقرحة وتحويلها من جرح مزمن إلى جرح حاد.
- 2. تنظيف القرحة بالسيروم الملحي بشكل جيد.
- 3. تطبيق طبقة رقيقة من Regen-D وتغطية الجرح -القرح بضماد عقيم.
- 4. تطبيق Regen-D كل 12 ساعة لنتائج أفضل.
- 5. يجب أن يستخدم العبوة شخص واحد فقط بشكل فردي.

ملاحظة: Regen-D جل : هو عامل التئام للجروح وهو ليس علاج /شفاء لمرض السكري.

• تحذيرات:

- Regen-D جيد التحمل عموماً. ومع ذلك، لا يجب وصف المنتج أو تكراره لأشخاص من المعروف أنه لديهم فرط حساسية لأي من مكونات المنتج.
- لا يطبق Regen-D عند الحوامل والمرضعات أو في حال عدم ضبط سكر الدم.

• مضادات الاستطباب:

- تاريخ سابق لأعراض المناعة الذاتية الحادة أو المزمنة الحالية.
- اختلاط القرحة بالإنتان.
- القرحة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة حسب مقياس واغنز.
- في حال تحسس المريض لأي مكون من مكونات المنتج
- الحالات المعالجة بمثبطات المناعة

يجب أن يستمر العلاج بـ Regen-D لـ 2-3 أسابيع. يعود استمرار العلاج لتقدير الطبيب. أي استخدام غير مبرر للمنتج ليس من مسؤولية الشركة المصنعة أو الموزعة.

• الحفظ:

- يحفظ Regen-D في درجة حرارة بين الـ 2-8 سيلسيوس.
- لا تجمده.
- تجنب تركه في الخارج لفترة طويلة

استشر الطبيب للحصول على مزيد من المعلومات

نظام Wagner لتصنيف القرحة (Wagner Ulcer Classification System)

Regen-D يستخدم	0. لا يوجد آفات مفتوحة. قد يكون هناك تشوه أو التهاب في النسيج الخلوي
Regen-D يستخدم	1. قرحة السكري سطحية (السّمك الجزئي أو الكامل)
Regen-D يستخدم	2. توسع القرحة إلى الرباط، الوتر، المفصل، أو الطبقة العميقة دون خراج أو التهاب العظم والنقي
لا يستخدم Regen-D	3. قرحة عميقة مع خراج، التهاب العظم والنقي، أو الإنتان
لا يستخدم Regen-D	4. غرغرينا متمركزة في مقدمة القدم أو الكعب
لا يستخدم Regen-D	5. غرغرينا متقدمة تمتد إلى كامل القدم

مرخص من قبل وزارة الصحة السورية

صنع من قبل Bharat Biotech



مستورد من قبل مستودع بلاد الشام، ليفانت، للأدوية الهند

Syria, Damascus, P.O. Box 8446
Tel: + 963 11 513 8015 / Fax: +963 11 513 8019
E-mail: levanthealthcare@gmail.com
www.levanthealthcare.com

• السلامة:

آمن وفعال، وقد ثبت ذلك في المراحل المختلفة من التجارب السريرية الدراسات الأولية والسمية:

- دراسة الجرعة 14 يوم (دراسة نويل).
- دراسة السمية الحادة 7 أيام.
- دراسة السمية شبه الحادة 30 يوم.
- دراسة تهيج الجلد 14 يوم.
- دراسة تهيج العين 7 أيام.
- ثبت أن الدراسات قبل / بعد السريرية آمنة في جميع المراحل.
- أثبت Regen-D انخفاض ردود الفعل والتحمل الجيد.

• في حالات نادرة:

قد يحدث فرط الحساسية، والأعراض الشائعة التي يتم التعرف عليها بسرعة من قبل الطبيب هي الدوخة، والصداع، والغثيان، وآلام في البطن، والطفح الجلدي، الحكة.

طريقة تطبيق Regen-D

1

- تخصص كل عصارة لمريض واحد فقط.
- يجب غسل اليدين جيداً قبل التطبيق، ويفضل استخدام كفوف عقيمة.



2

- يجب ألا تلامس أطراف الأنبوب القرحة أو أي سطح آخر
- قبل تطبيق Regen-D، يجب غسل الجرح بالسيروم الملحي لتنظيف منطقة الجرح بشكل جيد



3

- استخدم أدوات مساعدة نظيفة عند التطبيق (قطن طبي، خافض اللسان، الخ).
- يجب تطبيق الجل بشكل متساوٍ على مساحة القرحة بما في ذلك الهوامش للحصول على طبقة رقيقة متصلة



4

- يجب تغطية الجل بعد تطبيقه على الجرح بشاش معقم.



5

- يجب إغلاق الأنبوب بإحكام بعد كل استعمال.

